BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

ARCHIVO DOCUMENTAL

GOBIERNO DE CANARIAS

PELCRIN

F00529

biota

PUBLICACIÓN

Tipo de publicación: Libro **Nº de fotocopias:** 201

Autor/es: Ceballos, L. & Ortuño, F.

Año: 1976

Título: Estudio sobre la vegetación y flora forestal de las Canarias Occidentales

Editorial: Excmo. Cabildo Insular Tenerife **Nº Edición:**

Volumen: **Número:** **Páginas:** 1-433

Palabras clave: BIOGEOGRAFÍA, TAXONOMÍA, UTILIDAD, ECOLOGÍA & BIOLOGÍA

NOTAS

Supervisor de Fanerogamia: Esperanza Beltrán.
Supervisor de Criptogamia: Esperanza Beltrán.

1.- De este documento sólo se han fotocopiado las páginas correspondientes a la vegetación y el catálogo florístico.
2.- Ver Referencia de Experto F00321.
3.- Ver Nota de Incidencia F00534.
4.- Las citas para Sideritis macrostachys Poir. para Los Silos no han sido tomadas en cuenta. Ver Nota de Incidencia F00824.
5.- Para el taxón Silene berthelotiana Webb se considera dudosa su presencia en la isla de El Hierro, y así se ha hecho constar en el documento.
6.- Las citas para Tenerife de Lavandula pinnata L. f. no han sido tenidas en cuenta ya que su presencia en dicha isla no está confirmada. Ver Nota de Incidencia F00830.
7.- Los datos corológicos de Cytisus virgatus Link han sido omitidos. Ver Referencia de Experto F00679.
8.- Las citas para Osyris quatripartita de Bco. del Río han sido omitidas por prestarse a confusión.
9.- Se obvia la cita de Paronychia echinata en Las Cañadas, al estar esta especie presente únicamente en C y la P.

ADMINISTRACIÓN

Fecha inicio: 18-02-2000 **Fecha final:** 01-07-2005

Operador: Marrero Gómez, María del Carmen **Supervisor:** de la Cruz López, Salvador

Firma: **Firma:**

10.- Tolpis lagopoda, taxón endémico de P, T y C no se encuentra presente en el H y así se ha hecho constar en el documento.
11.- Las citas de Masca y Los Silos, para la especie Dorycnium spectabile, no se han tenido en cuenta por considerarse que no tienen fundamento.
12.- Para la distribución de Dorycnium spectabile, ver Referencia de Experto F01506.
13.- Para Echium wildpretii ssp. trichosyphon y Cheirolophus junonianus, ver Referencia de Experto F01520.
14.- Para la distribución de Echium pininana, Lavatera phoenicea, Limonium redivivum y Pimpinella anagodendron, ver Referencia de Experto F01523.
15.- Para la distribución de Bencomia exstipulata, ver Referencia de Experto F01496.
16.- Los datos dados para Bencomia caudata (Aiton) Webb & Berthel. para la isla de El Hierro, ha sido asignada a Bencomia sphaerocarpa Svent. según informa Stierstorfer & Gaisberg 2006 (F01774).
16.- Para la distribución de Cheirolophus webbianus, Limonium perezii, Parolinia schizogynoides y Osyris lanceolata ver Referencia de Experto F01525.
17.- La distribución de Apollonias barbujana subsp. ceballosi y Stemmacantha cynaroides ha sido precisada por el documento F01656.
18.- La distribución de Lotus maculatus, ha sido precisada por el documento F01667 (SEGA 2007).
19.- La distribucion de Bencomia sphaerocarpa, ha sido precisada por el documento F01686 (SEGA 2005).
20. Lotus berthelotii ha sido precisada por Elizabeth Ojeda (F01699)
21. Kunkeliella psilotoclada, ver referencia de experto F01698 (página 11).
22.- Ver documento C00323.
23.- Se habla de la distribución de Laurus azorica (Laurus novocanariensis), en áreas de monteverde. Por tal motivo hemos considerado esta área como el Parque Nacional de Garajonay en su totalidad, y esta es la localidad que le hemos asignado a su fitopatógeno, Laurobasidium lauri.
24.- Salix fragilis L., se considera taxon híbrido por D03441.